

FICHE DE SUIVI DES INJECTIONS

À REMPLIR PAR LE MÉDECIN OU L'INFIRMIER RÉALISANT L'INJECTION
ET À CONSERVER PAR LE PATIENT.

RAPPEL de l'importance de toujours respecter scrupuleusement les modalités d'administration validées par l'autorisation de mise sur le marché pour permettre de diminuer le risque d'erreur d'administration.

CE N'EST PAS UN DOCUMENT DE MESURE ADDITIONNELLE DE RÉDUCTION DES RISQUES (MARR)



■ Schéma posologique :

FIRMAGON® doit être administré par un professionnel de santé **UNIQUEMENT** par voie sous-cutanée profonde dans la région abdominale. Des précautions doivent être prises pour éviter de faire une injection accidentelle dans une veine ou un vaisseau sanguin. Remontez doucement le piston pour vérifier si du sang est aspiré. Si du sang apparaît dans la seringue, le produit ne peut plus être utilisé. Stoppez la manipulation et jetez la seringue et l'aiguille. Procédez à la reconstitution d'une nouvelle dose pour le patient.



Avant l'administration, il faut procéder à la reconstitution de FIRMAGON®. Pour les instructions de reconstitution reportez-vous à la section 6.6 du RCP ou à la notice d'utilisation de FIRMAGON® et faites très attention de toujours prélever le volume précisé en fonction du dosage. L'administration d'autres concentrations n'est pas recommandée car la formation du gel dépôt est influencée par la concentration. La solution reconstituée doit être limpide, sans particule visible. Répéter la procédure de reconstitution pour une seconde dose et choisissez un site d'injection différent.


Avant reconstitution : ce médicament n'exige pas de conditions de conservation particulières.

Après reconstitution : ce médicament **doit être injecté immédiatement**. La solution reconstituée doit être limpide, sans particule visible.

→ **Pour l'injection, adoptez les bons réflexes.**


RESPECTER LES MODALITÉS D'ADMINISTRATION.

Il est préférable de varier le site d'injection dans la région abdominale. Ne pas réaliser l'injection dans les parties du corps exposées à une pression par exemple à proximité de la ceinture, de la taille ou des côtes. Prévenez votre patient que l'injection est très fréquemment douloureuse lors de l'initiation du traitement.



- Pincez la peau de l'abdomen, tirez vers le haut le tissu **sous-cutané** et insérez **profondément** l'aiguille sous un angle d'au moins **45°**.

- Injectez **très lentement** pendant **1 minute**, immédiatement après la reconstitution.




- **Une fois l'injection faite, maintenez l'aiguille en place pendant 30 secondes.**

- Retirez l'aiguille lentement en maintenant l'angle de **45°**.

- Ensuite, relâchez la peau.

■ Après l'injection FIRMAGON® forme un gel* :



- **Ne pas frotter le site d'injection** après avoir retiré l'aiguille. Mettre un pansement.

*Notice d'utilisation de FIRMAGON®.

Vous pouvez obtenir des conseils sur l'administration et le bon usage de FIRMAGON® en contactant l'information médicale à l'adresse e-mail suivante information.medicale@ferring.com ou par téléphone au 01 49 08 67 60



Flashez ce code ou connectez-vous à l'adresse : <https://administration-firmagon.fr/> avec votre smartphone ou votre tablette et retrouvez en vidéo les instructions pour la reconstitution et l'administration de FIRMAGON®

